



Instrucciones Postoperatorias de Esterilización/Castración

Proporcionado por SBPA (Programa de Esterilización para Animales)

¡Gracias por ser parte de la solución al problema de la sobrepoblación animal! Su mascota fue sometida a una cirugía de esterilización hoy. Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar una recuperación segura y saludable. Entendemos que, en el caso de perros/gatos callejeros o animales sin dueño, seguir estas instrucciones puede no ser práctico. Cualquier cuidado postoperatorio que pueda proporcionarse será útil para una recuperación exitosa del animal.

1. Cuidado General

- Mantenga a su mascota dentro de casa y abrigada esta noche. La anestesia reduce la temperatura corporal y la coordinación.
- Limite la actividad durante 7–10 días. No permitir correr, saltar ni juegos bruscos.
- Use correa al sacar a su perro. Para gatos, manténgalos confinados en una habitación pequeña o transportadora si es necesario.

2. Sitio de la Incisión

- No bañe a su mascota ni permita que nade durante 10 días.
- Revise la incisión dos veces al día. Una pequeña cantidad de enrojecimiento o hinchazón es normal.
- No aplique ungüentos ni peróxido de hidrógeno—puede retrasar la curación.
- Llame a un veterinario si observa:
 - o Hinchazón o enrojecimiento severo
 - o Supuración (pus o sangre)
 - o Incisión abierta o con separación
 - o Lamido o mordisqueo persistente del área
- O bien, si estos problemas ocurren el mismo día de la clínica, regrese con el animal lo antes posible para tratamiento de seguimiento.



3. Prevenir Lamido

- Si su mascota intenta lamer la incisión, utilice un collar isabelino (cono) o traje de recuperación.
 - Lamer puede causar infecciones o abrir la incisión.
-

4. Alimentos y Agua

- Ofrezca una pequeña cantidad de comida y agua esta noche.
 - Su mascota puede tener poco apetito por 24 horas debido a la anestesia.
 - Si vomita, suspenda la comida hasta la mañana siguiente y ofrezca una comida suave.
-

5. Manejo del Dolor

- Su mascota recibió una inyección para el dolor hoy.
 - No le dé medicamentos para humanos — muchos son tóxicos para los animales.
 - Contacte a su veterinario si su mascota parece muy incómoda después de 24 horas. Si la clínica está abierta al día siguiente (clínicas los sábados), regrese con su animal para evaluación.
-

6. Monitoreo del Comportamiento

- Es normal que su mascota esté algo aturdida o tiemble después de la cirugía.
 - Contacte a un veterinario si su mascota presenta:
 - o Dificultad para respirar
 - o Encías pálidas
 - o Colapso o falta de respuesta
 - o Rechazo a comer o beber después de 24 horas
-

7. Puntos de Sutura

- La mayoría de las incisiones tienen suturas absorbibles y no necesitan ser retiradas.
-



Contacto de Emergencia

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la recuperación de su mascota, por favor llame a un veterinario si el problema parece serio. Para preguntas generales, contacte a su veterinario o envíe un correo electrónico a SBPA para consultas no urgentes y le responderemos lo antes posible:

Correo electrónico: hola@sbpamx.org

Clínica SBPA - Av. E, Ranchito Campestre, 85506 San Carlos, Son., México

¡Gracias por cuidar a los animales de nuestra comunidad! La esterilización es un gran paso hacia el control de la sobrepoblación animal y proporciona una vida más saludable, larga y con un mejor futuro para los animales de nuestra comunidad.